

CONTEXTE	EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)
APPROCHE DE L'INTERVENTION (SANS PRECISION D'UN CONTEXTE)	<p style="text-align: center;">EPI de base</p> <p style="color: red;">Maque N-95 (ou équivalent*) + Lunettes + Gants + Masque au patient (si toléré)</p>
PRECISION DU CONTEXTE (à l'affectation de l'appel et/ou observation clinique à distance de 2 mètres)	
<p>COVID CONFIRME, SUSPECTÉ ou INDÉTERMINÉ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Selon critères de la vigie en vigueur <p>Nébulisation</p> <p>Intervention générant des aérosols :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aspiration trachéale - Intubation** / extubation - Assistance ventilatoire - Assistance respiratoire - Soins de trachéostomie** - RCR (avec ventilation) - Désobstruction par laryngoscopie <p>L'une des présentations cliniques suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> - S/S Respiratoires sévères (Tirage, Tachypnée plus 24/min) - S/S Choc - Altération état conscience 	<p style="text-align: center;">EPI de base + Jaquette</p> <p style="color: red;">Maque N-95 (ou équivalent*) + Lunettes + Gants + Jaquette + Masque au patient (si toléré)</p>
<p style="text-align: center;">Vigie COVID</p> <p>Tableau clinique VIGIE :</p> <p>-Un (1) ou plusieurs des symptômes suivants : Dyspnée; Fièvre > 38, Mal de gorge, Perte subite de l'odorat (anosmie); Perte de goût (agueusie); Toux nouvelle ou aggravée.</p> <p>-Deux (2) ou plusieurs des symptômes suivants : Céphalée; Congestion nasale; Diarrhée; Douleur abdominale; Douleurs musculaires généralisées; Fatigue intense; Nausées ou vomissements; Perte d'appétit importante; Rhinorrhée.</p> <p>Lien épidémiologique : Patient est-il à risque d'avoir contracté la COVID dans les <10jrs?</p> <ul style="list-style-type: none"> -En vivant sous le même toit qu'une personne confirmée COVID 19? -En côtoyant une personne confirmée COVID 19 sans mesures de protection à moins de 2 mètres durant 15 minutes et plus? -En ayant fréquenté un milieu déclaré en éclosion de la COVID 19? -Retour d'un voyage à l'étranger moins <15 jrs? <p>Résultat :</p> <ul style="list-style-type: none"> -Confirmé: COVID positif < 10 jours (test rapide OU PCR) -Suspecté: Tableau clinique (+) ET\OU Lien épidémiologique (+) -Non suspecté : Tableau clinique (-) ET Lien épidémiologique (-) -Indéterminé: Questionnaire impossible à réaliser (usager ou témoin fiable) 	

* Le N-95 est fortement recommandé par la DMN. Le P-100 est une alternative sécuritaire au N-95 pour la protection du travailleur. Toutefois, il est à éviter puisqu'il ne filtre pas l'air expiré, il expose les autres à un risque infectieux si le travailleur est contagieux.

** Double gants